

ESERCIZI: IDENTITÀ (vedi riquadro a pag. 135) CON PRODOTTI NOTEVOLI, DA VERIFICARE

1) A) $(a+b)^2 + (a-b)^2 = 2(a^2 + b^2)$ B) $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$

2) $(a+b+c)^2 + (a^2 + b^2 + c^2) = (a+b)^2 + (a+c)^2 + (b+c)^2 = 2(a^2 + b^2 + c^2 + ab + ac + bc)$
(qui le identità sono 3, ma per la proprietà transitiva dell'uguaglianza basta verificarne 2 a scelta ...)

3) $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac)^2 + (ad)^2 + (bc)^2 + (bd)^2 = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$

3') Le precedenti identità 3), dette "di Lagrange" o "di Fibonacci",
possono essere utilizzate per esprimere un numero intero come somma

- di 4 quadrati perfetti
- oppure di 2 quadrati perfetti (in due modi).

A) Ad es., sapresti fare questo per l'intero $4453 = 61 \cdot 73$? (Trova 2 interi a, b tali che $a^2 + b^2 = 61$, poi ...)B) Osservato che $2^2 + 12^2 = 148$, trova 4 numeri per cui la somma dei quadrati sia uguale a $148^2 = 21904$.

4) Controlla la validità dell'identità

$$(10d_1 + u_1)(10d_2 + u_2) = 100d_1d_2 + 10(d_1u_2 + d_2u_1) + u_1u_2$$

Spiega in che modo essa potrebbe aiutare a svolgere a mente il prodotto di due interi di due cifre ciascuno:

$$x = 10d_1 + u_1, \quad y = 10d_2 + u_2 \quad (\text{esempio: } 45 \cdot 67, \text{ dove } d_1 = 4, u_1 = 5, d_2 = 6, u_2 = 7)$$

Stupisci ora i compagni con la tua capacità di eseguire a mente il prodotto di due numeri con due cifre!

Particolarizza anche l'identità al caso in cui i numeri da moltiplicare sono uguali,
osservando la relazione di quest'ultimo procedimento con la formula per il quadrato di un binomio.
E calcola con questa modalità 84^2 .

5) $(a+b+c)^2 - (a-b+c)^2 = 4b(a+c)$ 6) $(a-b)^3 + (b-c)^3 + (c-a)^3 = 3(a-b)(b-c)(c-a)$

7) $(a+b)^3 - (a-b)^3 = 2b(3a^2 + b^2)$ 8) $(a+b)^4 - (a-b)^4 = 8ab(a^2 + b^2)$

9) Formule di Waring:

A) $a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b)$

B) $a^4 + b^4 = (a+b)^4 - 4ab(a+b)^2 + 2a^2b^2$

C) $a^5 + b^5 = (a+b)^5 - 5ab(a+b)^3 + 5a^2b^2(a+b)$

A), B), C) fanno parte di una famiglia di identità,
chiamate "formule di Waring" in onore del matematico inglese Edward Waring (1736-1798),
che permettono di esprimere una somma di due potenze di ugual grado
per mezzo della somma e del prodotto delle basi.

10) $(a+b+c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3(a^2b + a^2c + ab^2 + b^2c + ac^2 + bc^2) + 6abc$


11) $a^5 - a = (a-2) \cdot (a-1) \cdot a \cdot (a+1) \cdot (a+2) + 5 \cdot (a-1) \cdot a \cdot (a+1)$. Quanto vale $8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12 + 5 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11$?

11') (dal bellissimo sito francese dedicato ai numeri di Gérard Villemin: <http://villemin.gerard.free.fr>)

Serviti dell'identità 11) per dimostrare che

- se a è un intero dispari, il numero $a^5 - a$ è sempre divisibile per 120
- mentre se a è un intero pari, il numero $a^5 - a$ è sempre divisibile per 30.

12) $(a^2 - b^2)^2 + (2ab)^2 = (a^2 + b^2)^2$

che viene utilizzata per costruire *terne pitagoriche*
(a, b interi non nulli diversi fra loro qualunque).Una "**TERNA PITAGORICA**" è una **terna di interi** **a, b, c , tutti non nulli, tali che $a^2 + b^2 = c^2$.**Ad es., la $(3, 4, 5)$ lo è in quanto $3^2 + 4^2 = 5^2$.Anche $(16, 30, 34)$ è una terna pitagorica: controlla!... Come mai, piuttosto che l'uguaglianza $a^2 + b^2 = c^2$, è più semplice verificare la $a^2 = c^2 - b^2$?

12') Osservato che $5^2 + 11^2 = 146$, serviti dell'identità $(a^2 - b^2)^2 + (2ab)^2 = (a^2 + b^2)^2$
per determinare una terna pitagorica che abbia 146 come terzo elemento.

$$13) \text{ A) } a^2 + \left(\frac{a^2-1}{2}\right)^2 = \left(\frac{a^2+1}{2}\right)^2 \quad \text{B) } a^2 + \left(\left(\frac{a}{2}\right)^2 - 1\right)^2 = \left(\left(\frac{a}{2}\right)^2 + 1\right)^2$$

A) viene impiegata per costruire terne pitagoriche, prendendo a dispari,

B) serve allo stesso scopo con a pari

13') Applica le formule precedenti per determinare due terne pitagoriche che abbiano come primo elemento rispettivamente 31 e 32

DA UN'IDENTITÀ, RICAVARNE ALTRE PER SOSTITUZIONE

□ Partiamo dalla $a^2 + b^2 = \frac{(a+b)^2 + (a-b)^2}{2}$ e facciamo le sostituzioni $\begin{matrix} a \rightarrow a \text{ (cioè, } a \text{ resta inalterato)} \\ b \rightarrow a+2 \end{matrix}$

Otteniamo così $a^2 + (a+2)^2 = \frac{(a+a+2)^2 + (a-(a+2))^2}{2}$ ossia

$$a^2 + (a+2)^2 = \frac{(2a+2)^2 + (-2)^2}{2}; \quad a^2 + (a+2)^2 = \frac{[2(a+1)]^2 + 4}{2};$$

$$a^2 + (a+2)^2 = \frac{4(a+1)^2 + 4}{2}; \quad a^2 + (a+2)^2 = \frac{4(a+1)^2}{2} + \frac{4}{2}; \quad \boxed{a^2 + (a+2)^2 = 2(a+1)^2 + 2}$$

Supponiamo che a sia un intero: l'ultima identità ci dice allora che la somma dei quadrati di due interi che differiscono di 2 unità si può ottenere prendendo l'intero fra essi compreso, elevandolo al quadrato, raddoppiando il numero ottenuto e aggiungendo 2 unità.

Prova ad eseguire in questo modo il calcolo $99^2 + 101^2$!

□ (Paolo Pellegrini)

$$ab = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 \quad \text{da cui} \quad a^x \cdot a^y = \left(\frac{a^x+a^y}{2}\right)^2 - \left(\frac{a^x-a^y}{2}\right)^2$$

$$\text{che con } x=3 \text{ e } y=2 \text{ diventa } a^5 = \left(\frac{a^3+a^2}{2}\right)^2 - \left(\frac{a^3-a^2}{2}\right)^2 \quad \text{o anche} \quad a^5 = \left(\frac{a^2(a+1)}{2}\right)^2 - \left(\frac{a^2(a-1)}{2}\right)^2$$

14) Riparti dalle osservazioni di P. Pellegrini, e costruisci quella identità che permette di esprimere un cubo come differenza di due quadrati. Servitene poi per esprimere come diff. di quadrati il numero $343 = 7^3$.

15) Se sostituiamo $-b$ al posto di b , cosa diventano le identità seguenti? A) $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
B) $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ C) $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ D) $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$

16) Verifica che risulta, qualunque siano a e b , $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$ e scrivi l'identità che si può ricavare da questa con le sostituzioni $a \rightarrow a+1$; $b \rightarrow a$. Ricontrolla anche la nuova identità ottenuta.

RISPOSTE

3') A: $4453 = 61 \cdot 73 = (5^2 + 6^2)(3^2 + 8^2) = 15^2 + 40^2 + 18^2 + 48^2 = 63^2 + 22^2 = 33^2 + 58^2$ B: 4, 24, 24, 144

4) $45 \cdot 67 = 100 \cdot 4 \cdot 6 + 10 \cdot (4 \cdot 7 + 6 \cdot 5) + 5 \cdot 7 = 2400 + 580 + 35 = 3015$

8) $84^2 = 100 \cdot 8 \cdot 8 + 10 \cdot (8 \cdot 4 + 8 \cdot 4) + 4 \cdot 4 = \dots$

11') $a^5 - a = (a-2) \cdot (a-1) \cdot a \cdot (a+1) \cdot (a+2) + 5 \cdot (a-1) \cdot a \cdot (a+1)$

Il prodotto $(a-2) \cdot (a-1) \cdot a \cdot (a+1) \cdot (a+2)$ di 5 interi consecutivi

è certamente divisibile per 120, perché fra 5 interi consecutivi

ce n'è uno (e uno solo) divisibile per 5, uno almeno per 3, due almeno pari consecutivi

quindi divisibili uno per 2 e l'altro per 4; ma allora tale prodotto sarà certo divisibile per $5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 4 = 120$.

Supponiamo a dispari: il prodotto $5 \cdot (a-1) \cdot a \cdot (a+1)$ ha un fattore 5, uno certamente divisibile per 3, fra i due fattori $(a-1)$ e $(a+1)$, entrambi pari, uno è divisibile per 2 e l'altro per 4; allora tale prodotto sarà anch'esso divisibile per $5 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 4 = 120$. Ora, la somma di due multipli di 120 è divisibile per 120 ...

12) $a^2 = c^2 - b^2 = (c+b)(c-b)$ e l'ultimo prodotto è spesso facile da trattare ... ad es., nel caso (16, 30, 34), è $34^2 - 30^2 = (34+30)(34-30) = 64 \cdot 4 = 8^2 \cdot 2^2 = 16^2$

12') 96, 110, 146

13') (31, 480, 481); (32, 255, 257)

14) $a^3 = \left(\frac{a^2+a}{2}\right)^2 - \left(\frac{a^2-a}{2}\right)^2$; $7^3 = 28^2 - 21^2$

15) A) $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ B) Resta invariata C) Ovviamente ... D) $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$

16) $(a+1)^3 - a^3 = (a+1-a)((a+1)^2 + (a+1) \cdot a + a^2) = (a+1)^2 + a(a+1) + a^2$

$$\begin{array}{r} 45 \\ 1 \\ \hline 67 \\ \cdot 100 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 45 \\ \times \\ 67 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 45 \\ 1 \\ \hline 67 \\ \cdot 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{Moltiplicare} \\ \text{due numeri} \\ \text{di due cifre} \end{array}$$