

4. SISTEMI LETTERALI

Esempio:

$$\begin{cases} ax - by = a^2 + b^2 \\ bx + ay = a^2 + b^2 \end{cases}$$

Per **SOSTITUZIONE**:

$$\begin{aligned} &\begin{cases} ax = a^2 + b^2 + by; & x = \frac{a^2 + b^2 + by}{a} & (a \neq 0) & \text{NOTA 1} \\ b \cdot \frac{a^2 + b^2 + by}{a} + ay = a^2 + b^2 \end{cases} \\ &\begin{cases} x = \frac{a^2 + b^2 + by}{a} \\ \frac{a^2b + b^3 + b^2y + a^2y}{\cancel{a}} = \frac{a^3 + ab^2}{\cancel{a}} \end{cases} \\ &\begin{cases} x = \frac{a^2 + b^2 + by}{a} \\ b^2y + a^2y = a^3 + ab^2 - a^2b - b^3 \end{cases} \\ &\begin{cases} " \\ (a^2 + b^2)y = a(a^2 + b^2) - b(a^2 + b^2) \end{cases} \\ &\begin{cases} " \\ (a^2 + b^2)y = (a^2 + b^2)(a - b); & y = a - b & \text{(NOTA 2)} \end{cases} \\ &\begin{cases} y = a - b \\ x = \frac{a^2 + b^2 + b(a - b)}{a} = \frac{a^2 + \cancel{b^2} + ab - \cancel{b^2}}{a} = \frac{\cancel{a}^2(a + b)}{\cancel{a}} = a + b \end{cases} \\ &\begin{cases} x = a + b \\ y = a - b \end{cases} \end{aligned}$$

NOTA 1

Questo passaggio, finalizzato a isolare x , è effettuabile solo nel caso $a \neq 0$; il caso particolare $a = 0$ andrà valutato a parte (lo riprenderemo alla fine dell'esercizio)

NOTA 2

La semplificazione dell'equazione è effettuabile solo nel caso $a^2 + b^2 \neq 0$; d'altra parte, potrebbe risultare $a^2 + b^2 = 0$ soltanto se fosse $a = b = 0$, e noi in questo momento ci siamo posti nel caso $a \neq 0$, quindi la quantità $a^2 + b^2$ per la quale abbiamo semplificato è certamente diversa da 0. Non è pertanto necessario porre alcuna condizione per la semplificazione.

Per **RIDUZIONE**:

$$\begin{aligned} &a \cdot \begin{cases} ax - by = a^2 + b^2 \\ bx + ay = a^2 + b^2 \end{cases} \quad (a \neq 0, b \neq 0: \text{vedi NOTA 3}) \\ &b \cdot \begin{cases} ax - by = a^2 + b^2 \\ bx + ay = a^2 + b^2 \end{cases} \\ &\begin{cases} a^2x - aby = a^3 + ab^2 \\ b^2x + aby = a^2b + b^3 \end{cases} \\ &(1) + (2) \begin{cases} a^2x + b^2x = a^3 + ab^2 + a^2b + b^3; & (\cancel{a^2 + b^2})x = (\cancel{a^2 + b^2})(a + b) \\ bx + ay = a^2 + b^2 \end{cases} \\ &\begin{cases} x = a + b \\ b(a + b) + ay = a^2 + b^2; & ab + \cancel{b^2} + ay = a^2 + \cancel{b^2}; & \cancel{a}y = a^2 - \cancel{a}b \end{cases} \\ &\begin{cases} x = a + b \\ y = a - b \end{cases} \end{aligned}$$

NOTA 3

Con l'obiettivo di mandar via la y , moltiplichiamo la prima equazione per a e la seconda per b . A tale scopo, dobbiamo supporre $a \neq 0$ e $b \neq 0$, quindi in coda all'esercizio dovremo andare a valutare cosa succede nei due casi particolari ($a = 0, b = 0$) che stiamo provvisoriamente lasciando da parte.

Con **CRAMER**:

$$\begin{cases} ax - by = a^2 + b^2 \\ bx + ay = a^2 + b^2 \end{cases}$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{\begin{vmatrix} a^2 + b^2 & -b \\ a^2 + b^2 & a \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & -b \\ b & a \end{vmatrix}} = \frac{a(a^2 + b^2) + b(a^2 + b^2)}{a^2 + b^2} = \frac{(a^2 + b^2)(a + b)}{a^2 + b^2} = a + b \quad (a^2 + b^2 \neq 0) \quad \text{NOTA 4}$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{\begin{vmatrix} a & a^2 + b^2 \\ b & a^2 + b^2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & -b \\ b & a \end{vmatrix}} = \frac{a(a^2 + b^2) - b(a^2 + b^2)}{a^2 + b^2} = \frac{(a^2 + b^2)(a - b)}{a^2 + b^2} = a - b \quad (a^2 + b^2 \neq 0)$$

NOTA 4

L'applicazione nel metodo di Cramer comporta l'introduzione di denominatori, quindi vale a condizione che i denominatori stessi siano diversi da 0.

Il caso opposto $a^2 + b^2 = 0$ (che si verifica esclusivamente con $a = b = 0$) andrà valutato a parte.

LA DISCUSSIONE DEL SISTEMA

Come abbiamo visto, **la risoluzione, con qualunque metodo venga effettuata, può comportare l'individuazione di casi particolari, che vengono "provvisoriamente messi da parte", per valutarli poi alla fine.**

Ad esempio,

- risolvendo con SOSTITUZIONE, abbiamo "accantonato" il caso $a = 0$;
- con RIDUZIONE, abbiamo lasciato da parte i casi $a = 0$ e $b = 0$;
- col metodo di CRAMER, abbiamo accantonato il caso $a^2 + b^2 = 0$ ($a = b = 0$)

♥ **Questi casi particolari vanno ripresi in coda all'esercizio, per capire "cosa diventa" il sistema in ciascun caso, e per stabilire se si tratta, eventualmente, di un caso di impossibilità o di indeterminazione per il sistema.**

□ Ad esempio, se abbiamo risolto con SOSTITUZIONE, il caso accantonato è $a = 0$.

Bene! Con $a = 0$ il sistema $\begin{cases} ax - by = a^2 + b^2 \\ bx + ay = a^2 + b^2 \end{cases}$ diventa

$$\begin{cases} -by = b^2 \\ bx = b^2 \end{cases} \text{ e ora possiamo dire che:}$$

- se $b \neq 0$ è lecito semplificare entrambe le equazioni ottenendo $\begin{cases} x = b \\ y = -b \end{cases}$
- se invece è anche $b = 0$ il sistema è **COMPLETAMENTE INDETERMINATO** (qualsiasi coppia (x, y) ne è soluzione).

Osserviamo che, con $a = 0$ e $b \neq 0$, la soluzione ottenuta $\begin{cases} x = b \\ y = -b \end{cases}$ non è altro che

$$\text{la "normalissima" soluzione } \begin{cases} x = a + b \\ y = a - b \end{cases},$$

nel caso particolare $a = 0$!!!

E allora l'unico caso "anomalo" per questo sistema è in definitiva il caso $a = b = 0$, nel quale il nostro sistema risulta, come abbiamo visto, completamente indeterminato.

□ Analogamente, se si è risolto con RIDUZIONE, occorre riprendere i due casi accantonati ecc. Stessa cosa se la risoluzione è stata effettuata con CRAMER: va ripreso il caso accantonato. E' ovvio che la conclusione della discussione dovrà essere sempre la medesima, comunque si proceda.

Ecco qui di seguito **un altro esempio**.

Si tratta di un sistema che si presta molto bene ad essere risolto per RIDUZIONE.

$$\begin{cases} (a^2 + 9)(x + y - 1) = 6a(x - y) \\ (a - 3)(x - y - 1) = 6y \end{cases}$$

Portiamo innanzitutto in “forma normale”:

$$\begin{cases} (a^2 + 9)(x + y - 1) = 6a(x - y) \\ (a - 3)(x - y - 1) = 6y \end{cases}$$

$$\begin{cases} a^2x + a^2y - a^2 + 9x + 9y - 9 = 6ax - 6ay \\ ax - ay - a - 3x + 3y + 3 = 6y \end{cases}$$

$$\begin{cases} a^2x - 6ax + 9x + a^2y + 6ay + 9y = a^2 + 9 \\ ax - 3x - ay - 3y = a - 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (a^2 - 6a + 9)x + (a^2 + 6a + 9)y = a^2 + 9 \\ (a - 3)x - (a + 3)y = a - 3 \end{cases}$$

$\begin{cases} (a - 3)^2 x + (a + 3)^2 y = a^2 + 9 \\ (a - 3)x - (a + 3)y = a - 3 \end{cases}$	FORMA NORMALE
--	---------------

Risolvi per **RIDUZIONE**, moltiplicando la seconda equazione per $(a + 3)$

Con $a \neq -3$ (NOTA): $(a + 3) \cdot \begin{cases} (a - 3)^2 x + (a + 3)^2 y = a^2 + 9 \\ (a - 3)x - (a + 3)y = a - 3 \end{cases}$

$$\begin{cases} (a - 3)^2 x + (a + 3)^2 y = a^2 + 9 \\ (a^2 - 9)x - (a + 3)^2 y = a^2 - 9 \end{cases}$$

NOTA

La moltiplicazione per $(a + 3)$ è effettuabile soltanto supponendo $a \neq -3$, altrimenti l'equazione verrebbe moltiplicata per 0 e quindi “distrutta”. Il caso particolare $a = -3$ andrà valutato separatamente.

$$\begin{aligned} (1) + (2) & \begin{cases} (a - 3)^2 x + (a^2 - 9)x = a^2 \cancel{+ 9} + a^2 \cancel{- 9} \\ (a - 3)x - (a + 3)y = a - 3 \end{cases} \\ (2) & \begin{cases} a^2x - 6ax \cancel{+ 9x} + a^2x \cancel{- 9x} = 2a^2 \\ (a - 3)x - (a + 3)y = a - 3 \end{cases} \\ & \begin{cases} 2a^2x - 6ax = 2a^2; \quad a^2x - 3ax = a^2; \quad ax - 3x = a \quad (a \neq 0); \\ (a - 3)x - (a + 3)y = a - 3 \end{cases} \\ & \begin{cases} (a - 3)x = a; \quad x = \frac{a}{a - 3} \quad (a \neq 3); \\ \cancel{(a - 3)} \cdot \frac{a}{\cancel{a - 3}} - (a + 3)y = a - 3 \end{cases} \\ & \begin{cases} x = \frac{a}{a - 3} \\ \cancel{a} - (a + 3)y = \cancel{a} - 3; \quad (a + 3)y = 3; \quad y = \frac{3}{a + 3} \quad (a \neq -3) \end{cases} \end{aligned}$$

Cerchiamo ora di capire (DISCUSSIONE)

cosa accade nei casi particolari, che abbiamo provvisoriamente lasciato da parte.

DISCUSSIONE

Il sistema in forma normale era

$$\begin{cases} (a-3)^2 x + (a+3)^2 y = a^2 + 9 \\ (a-3)x - (a+3)y = a-3 \end{cases}$$

Vediamo cosa diventa, rispettivamente, nei tre casi: $a = -3$; $a = 3$; $a = 0$

- Con $a = -3$ il sistema diventa

$$\begin{cases} (-3-3)^2 x + (-3+3)^2 y = (-3)^2 + 9 \\ (-3-3)x - (-3+3)y = -3-3 \\ 36x = 18; \quad x = 1/2 \\ -6x = -6; \quad x = 1 \end{cases}$$

Le due equazioni sono, evidentemente, incompatibili; il sistema, con $a = -3$, è IMPOSSIBILE.

- Con $a = 3$ il sistema diventa

$$\begin{cases} (3-3)^2 x + (3+3)^2 y = 3^2 + 9 \\ (3-3)x - (3+3)y = 3-3 \\ 36y = 18; \quad y = 1/2 \\ -6y = 0; \quad y = 0 \end{cases}$$

Le due equazioni sono, evidentemente, incompatibili; il sistema, con $a = 3$, è IMPOSSIBILE.

- Con $a = 0$ il sistema diventa:

$$\begin{cases} 9x + 9y = 9; \quad x + y = 1 \\ -3x - 3y = -3; \quad x + y = 1 \end{cases}$$

Le due equazioni coincidono; il sistema, con $a = 0$, è INDETERMINATO

e ha come soluzioni le infinite coppie: $\begin{cases} x \text{ qualsiasi} \\ y = 1 - x \end{cases}$

Risolvendo per **SOSTITUZIONE** avremmo avuto passaggi più pesanti:

$$\begin{cases} (a-3)x = (a+3)y + a-3; \quad x = \frac{(a+3)y + a-3}{a-3} \quad (a \neq 3) \\ (a-3)^2 \cdot \frac{(a+3)y + a-3}{a-3} + (a+3)^2 y = a^2 + 9 \\ \left\{ \begin{aligned} x &= \frac{(a+3)y + a-3}{a-3} \\ (a-3)((a+3)y + a-3) + (a+3)^2 y &= a^2 + 9 \end{aligned} \right. ; \quad \left\{ \begin{aligned} &" \\ a^2 y - 9y + a^2 - 6a + 9 + a^2 y + 6ay + 9y &= a^2 + 9 \end{aligned} \right. \\ \left\{ \begin{aligned} &" \\ 2a^2 y + 6ay &= 6a; \quad a^2 y + 3ay = 3a; \quad ay + 3y = 3 \quad (a \neq 0) \end{aligned} \right. \\ \left\{ \begin{aligned} x &= \frac{(a+3)y + a-3}{a-3} \\ (a+3)y &= 3; \quad y = \frac{3}{a+3} \quad (a \neq -3) \end{aligned} \right. ; \quad \left\{ \begin{aligned} x &= \frac{\cancel{(a+3)} \cdot \frac{3}{\cancel{a+3}} + a-3}{a-3} = \frac{\cancel{3} + a - \cancel{3}}{a-3} = \frac{a}{a-3} \\ y &= \frac{3}{a+3} \end{aligned} \right.$$

... e a questo punto avremmo dovuto, come prima, procedere con la valutazione dei casi particolari trovati, e provvisoriamente accantonati ($a = -3$, $a = 3$, $a = 0$).